

登園してはいけない病気一覧表

病 名	出席停止期間	主 な 症 状	侵入経路	潜伏期間	伝染期間	予 防 方 法	好発季節
インフルエンザ	発症後5日且つ解熱後3日を経過するまで	急な発熱、頭痛、咽頭痛 全身倦怠感、嘔吐、下痢	飛沫感染	1～2日	発病後3～4日	うがい、手洗い マスク、予防接種	冬 12月～3月
百 日 咳	特有の咳が消失するまで	のどの発赤、独特な咳	飛沫感染	6～15日	発病後28日	予防接種DPT (ジフテリア、百日咳、破傷風)	夏
麻 疹 (は し か)	解熱後3日を経過するまで	高熱、発疹	飛沫感染	10～12日	発疹のでる 5日前～後4日間	予防接種	冬～春
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ)	耳下腺、嚔下線又は舌下線の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで	耳下腺の腫張	飛沫感染	14～24日	発病7日前 ～発病後9日間	予防接種	冬～春
風 疹 (3日はしか)	発疹が消失するまで	バラ紅色の発疹 リンパ節の腫張	飛沫感染	14～21日	発疹のでる7日前 ～後7日間	予防接種	春～夏
水 痘 (みずぼうそう)	すべての発疹が痂皮化するまで	紅斑、丘疹、水疱、膿疱 痂皮の順に進行する発疹	飛沫感染 直接感染	11～20日	発疹のでる1日前 ～後6・7日間	予防接種	冬～春
咽頭結膜熱 (プール熱)	主要症状消退後2日を経過するまで	発熱、咽頭炎、結膜炎	飛沫感染 結膜接触	5～7日	発病後2～3週間	流水や石鹸による手洗い、うがいの励行 タオル共用しない	夏～秋
結 核	伝染のおそれなくなるまで	肺に病変を起こすことの多い 全身性感染症	飛沫感染	1～2ヶ月		BCG接種 X線による早期発見	な し
流行性角結膜炎	病状により医師によって 伝染のおそれないと認められるまで	涙、目やに、異物感 結膜の充血	結膜接触 汚染物	1週間以上	発病後2～3週間	水泳禁止。手洗い。 タオルの共用しない。	春～夏
伝染性膿痂疹 (とびひ)	出席停止の必要はない。	紅斑、膿水疱、びらん、痂皮 をつくる皮膚感染症	接触感染	2～10日		水泳禁止 皮膚に触れない	夏